

**FORMULAR PENTRU VERIFICAREA RESPECTĂRII CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE  
AFERENTE PROTOCOLULUI TERAPEUTIC  
PENTRU ACROMEGALIE ȘI GIGANTISM**

## **SECTIUNEA I - DATE GENERALE**

**1. Unitatea medicală:** .....

**2. CAS / nr. contract:** ..... / .....

**3.Cod parafă medic:**

--	--	--	--	--	--	--	--

**4.Nume și prenume pacient:** .....

**CNP / CID:**

**6.S-a completat "Secțiunea II- date medicale" din Formularul specific cu codul: .....**

**7.Tip evaluare:**  inițiere  continuare  întrerupere

#### **8. Încadrare medicament recomandat în Listă:**

boala cronică (sublista C secțiunea C1), cod G: 

--	--	--

PNS (sublista C secțiunea C2), nr. PNS: 

--	--	--

, cod de diagnostic (*varianta 999 coduri de boală*), după caz: 

--	--	--

ICD10 (sublista A, B,C secțiunea C3, D, după caz), cod de diagnostic (*varianta 999 coduri de boală*): 

--	--	--

**9. DCI recomandat:** 1)..... DC (după caz) .....

2)..... DC (după caz) .....

**10.\*Perioada de administrare a tratamentului:**  3 luni  6 luni  12 luni,

**11. Data întreruperii tratamentului:**

**12. Pacientul a semnat declaratia pe propria răspundere conform modelului prevăzut în Ordin:**

DA NU

\*Nu se completează dacă la “tip evaluare” este bifat “întrerupere”!

**1. CRITERII DE INCLUDERE ÎN TRATAMENT (eligibilitate) da  nu** **A. Monoterapie cu Analogi de somatostatin (Octreotidum sau Lanreotidum)**

1. 1a) Adenom hipofizar operat  cu rest tumoral vizibil TC/RMN  sau fără rest tumoral vizibil TC/RMN
- 1b) Adenom hipofizar neoperat  cu dimensiuni  $\geq 20$  mm, fără sindrom de compresiune optochiasmatică  sau cu dimensiuni  $<20$  mm dar cu contraindicații operatorii
- 1c) Adenom hipofizar operat și iradiat
- 1d) Adenom hipofizar iradiat, în condițiile persistentei contraindicațiilor operatorii
2. GH (OGTT)  $> 1\text{ng/ml}$   sau media GH/24 ore  $> 2,5 \text{ ng/ml}$  (la pacienții cu diabet zaharat)
3. IGF-1 crescut
4. Evaluări complementare:
  - a. PRL serică normală  sau crescută
  - b. HbA1c normală  sau crescută
  - c. LH, FSH, E2/T la femei/barbați de vârste fertile: normali  sau scăzuți
  - d. Modificări de câmp vizual da  nu
  - e. Litiază biliară da  nu
  - f. Cardiomielopatie da  nu

**B. Monoterapie cu Blocant de receptor GH (Pegvisomant) fără asociere cu analog de somatostatin**

- 1a) Răspuns parțial la analog de somatostatin în doza maximă în asociere cu Cabergolina minim 2 mg/săpt
- 1b) Răspuns parțial la asocierea analog de somatostatin, Cabergolina și Pegvisomant în doză maximă

**C. Blocant de receptor GH (Pegvisomant) în asociere cu analog de somatostatin**

- 1a) Răspuns parțial la analog de somatostatin în doză maximă în asociere cu Cabergolina minim 2mg/săpt  la un pacient cu adenom hipofizar operat  sau neoperat, cu dimensiuni sub 20 mm și contraindicații operatorii  , iradiat  sau neiradiat, în cazul pacienților de vârste fertile, fără insuficiență gonadotropă
- 1b) Raspuns parțial la Pegvisomant, doza maximă în monoterapie în asociere cu Cabergolina, minim 2 mg/sapt

**2. CRITERII DE CONTINUARE** da  nu

#### A. Monoterapie cu analog de somatostatin

1. Tratamentul cu ..... în doza de ..... a fost inițiat în luna..... anul.....: doza a fost crescută la .....  da  nu din luna.....anul ..... și la.....  da  nu din luna.....anul .....
  2. Tratamentul cu ..... in doza de ..... a fost reluat după 2 luni pauză terapeutică (după 3 ani de control optim al bolii)  da  nu din luna.....anul .....
  3. Tratamentul cu.....în doza de..... precedat de tratament cu.....în doza de....., care nu a controlat boala începând cu luna.....anul .....  da  nu
  4. Controlul terapeutic (IGF-1, GH) a fost obținut sub doza de Lanreotidum de:  
 PR 30 mg/14 zile  PR 30 mg/7 zile  AUTOGEL 120 mg/28 zile sau
  5. Controlul terapeutic (IGF-1, GH) a fost obținut sub doza de Octreotidum de:  
 30 mg/28 zile  30 mg/28 zile  40 mg/28 zile
  6. Adenomul hipofizar neoperat își menține dimensiunile > 20 mm  sau a scăzut < 20 mm, dar pacientul are contraindicații chirurgicale
  7. Tratament asociat cu Cabergolina .....mg/săpt necesar controlului bolii da  nu

#### **B. Monoterapie cu Blocant de receptor GH (Pegvisomant) fără asociere cu analog de somatostatin**

1. Tratamentul cu Pegvisomant în doza de .....a fost inițiat în luna.....anul....; doza a fost crescută la .....□ da □ nu din luna.....anul .....
  2. Tratamentul cu Pegvisomant în doza de ..... a fost reluat după 2 luni pauză terapeutică (după 5 ani de control optim al bolii) □ da □ nu din luna.....anul .....
  3. Controlul terapeutic (IGF-1 ) a fost obținut sub Pegvisomant în doza de:

20 mg/zi       30 mg/zi

*jet vs. Cabroncino*      [no/cont.](#) [no/no controlului](#)

- Plots of the ratio  $\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_5/\text{C}_6\text{H}_5\text{CH}_3$  versus the total concentration of  $\text{CH}_3\text{C}_6\text{H}_5$  are shown in Figure 1.

C. Bloquant de récepteur GH (Pegvisomant) III : associé au analog de somatostatine

1. Tratamentul combinat Pegvisomant în doza de ..... asociaț cu Octreotidum  sau Lanreotidum  a fost inițiat în luna ..... anul .....

2. Doza de Pegvisomant a fost crescută la ..... din luna ..... anul .....  da  nu

3. Tratamentul cu Pegvisomant în doza de ..... a fost reluat după 2 luni pauză terapeutică (după 3 ani de control optim al bolii)  da  nu din luna ..... anul .....

4. Controlul terapeutic (IGF-1) a fost obținut prin asocierea de Pegvisomant în doza de:  
 40 mg/sapt       60 mg/sapt       80 mg/sapt
5. Tratament asociat cu cabergolina....mg/săpt necesar controlului bolii da  nu

**3. CRITERII DE ÎNTRERUPERE**      **da**  **nu**

**A. Analog de somatostatin**

- a) Lipsa răspunsului la doza maximă, în asociere cu cabergolina, minim 2mg/săpt  
da  nu
- b) Reducerea dimensiunilor adenomului hipofizar neoperat sub 20 mm la un pacient fără  
contraindicații chirurgicale da  nu
- c) Complianța scăzuta la tratament da  nu

**B. Blocant de receptor GH (Pegvisomant) cu sau fără asociere cu analog de somatostatin**

- a) Creșterea titrului seric al transaminazelor hepatice la peste 3 ori limita maxima a  
normalului da  nu
- b) Lipsa răspunsului la asociere Pegvisomant în doză maximă, monoterapie  sau în  
asociere cu analog de Somatostatin
- c) Creșterea volumului tumoral hipofizar cu  $>/= 25\%$  din cel inițial da  nu
- d) Complianța scăzuta la tratament da  nu

Subsemnatul, dr....., răspund de realitatea și exactitatea completării prezentului formular.

Data:

Semnătura și parafa medicului curant

Originalul dosarului pacientului, împreună cu toate documentele anexate (evaluări clinice și buletine de laborator sau imagistice, consimțământul informat, declarația pe propria răspundere a pacientului, formularul specific, confirmarea înregistrării formularului etc.), constituie documentul-sursă față de care, se poate face auditarea/controlul datelor completeate în formular.