

Noiembrie 2017

**Comunicare directă către profesioniștii din domeniul sănătății****Misoprostol (Misodel): raportări privind cazuri de tahisistolie uterină excesivă care poate să nu răspundă la terapia tocicolitică**

Stimate profesionist din domeniul sănătății,

De comun acord cu Agenția Națională a Medicamentului și Diapozitivelor Medicale, compania Ferring Pharmaceuticals dorește să vă informeze despre existența unor raportări privind cazuri de tahisistolie uterină excesivă sub tratament cu misoprostol și măsurile care trebuie luate.

***Rezumat***

- Misoprostol poate cauza tahisistolie uterină excesivă care poate să nu răspundă la terapia tocicolitică.
- Misodel trebuie îndepărtat:
  - la declanșarea travaliului: contracții ritmice, puternice, de calitate corespunzătoare și care conduc la modificări la nivelul colului uterin și/sau cel târziu atunci când colul uterin ajunge la o dilatație de 4 cm
  - în cazul în care apar contracții uterine prelungite sau excesive
  - dacă există preocupări clinice pentru mamă și/sau copil.

***Informații suplimentare referitoare la problema de siguranță***

Misoprostol (Misodel) este indicat pentru inducerea travaliului la femeile cu un status nefavorabil al colului cervical în care inducerea travaliului este clinic indicată, începând din a 36-a săptămână de sarcină.

În studiile clinice și după introducerea pe piață a medicamentului au fost raportate cazuri de tahisistolie uterină care nu au cedat la terapia tocicolitică. O evaluare a acestor cazuri a concluzionat că aceste cazuri de tahisistolie uterină excesivă care pot să nu răspundă la terapia tocicolitică ar putea fi cauzate de utilizarea de misoprostol, chiar dacă medicamentul este utilizat în conformitate cu informațiile despre produs. Prospectul medicamentului a fost actualizat pentru a include această constatare și măsurile care trebuie luate pentru a asigura gestionarea corespunzătoare a acestui risc.

Sistemul cu codare vaginală trebuie îndepărtat imediat în următoarele situații:

- la declanșarea travaliului: contracții ritmice, puternice, de calitate corespunzătoare și care conduc la modificări la nivelul colului uterin și/sau cel târziu atunci când colul uterin ajunge la o dilatație de 4 cm, sau
- în cazul în care contracții uterine sunt prelungite sau excesive, și anume:
  - tahisistolie: mai mult de 5 contracții într-un interval de 10 minute, considerând

- media dintr-un interval de 30 de minute
- o contracții prelungite: contracții unice care durează 2 minute sau mai mult
- o contracții hipertonice: contracțiile sunt prea frecvente și tonusul uterin este crescut.
- dacă există preocupări clinice pentru mamă și/sau copil
- dacă au trecut 24 de ore de la inserarea sistemului cu cedare vaginală

Se recomandă ca terapia tocolitică să fie pregătită pentru administrare și, în cazul în care aceasta este necesară, să se poată administra imediat după îndepărțarea Misodel.

#### *Apel la raportarea de reacții adverse*

Este important să raportați orice reacție adversă suspectată, asociată cu administrarea medicamentului Misodel, către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, în conformitate cu sistemul național de raportare spontană, utilizând formularele de raportare disponibile pe pagina web a Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale ([www.anm.ro](http://www.anm.ro)), în secțiunea „Raportează o reacție adversă”.

**Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale**  
 Str. Aviator Sărătescu nr. 48, sector 1,  
 București 011478- RO, România  
 Fax: +4 0213 163 497  
 E-mail: [adr@anm.ro](mailto:adr@anm.ro)

Totodată, reacțiile adverse suspectate se pot raporta și către reprezentanța locală a Deținătorului autorizației de punere pe piață, la următoarele date de contact:

**Ferring Pharmaceuticals Romania S.R.L.**  
 Str. Coriolan Brediceanu nr. 10, clădirea C, et. 6  
 Timișoara 300011- RO, România  
 Tel: +40 356 113 270  
 Fax: +40 356 113 278  
 E-mail: [SafetyMailboxRomania@ferring.com](mailto:SafetyMailboxRomania@ferring.com)

#### *Coordonanțele de contact ale reprezentanței locale a Deținătorului autorizației de punere pe piață*

Dacă aveți întrebări suplimentare sau solicitați informații suplimentare privind medicamentul Misodel, vă rugăm să contactați reprezentanța locală:

**Ferring Pharmaceuticals Romania S.R.L.**  
 Str. Coriolan Brediceanu nr. 10, clădirea C, et. 6  
 Timișoara 300011- RO, România  
 Tel: +40 356 113 270  
 Fax: +40 356 113 278  
 E-mail: [SafetyMailboxRomania@ferring.com](mailto:SafetyMailboxRomania@ferring.com)  
[www.ferring.ro](http://www.ferring.ro)

Cu stimă,

Dr. Doru Torge

Director general