

**Comunicare directă către profesioniștii din domeniul sănătății privind
asocierea clopidogrelului cu apariția hemofiliei dobândite**

Stimate profesionist din domeniul sănătății,

Rezumat

Asociat tratamentului cu clopidogrel, s-a raportat un număr mic de cazuri de apariție a hemofiliei dobândite la persoane fără antecedente de modificări ale hemostazei.

- Pentru reducerea la minimum a duratei expunerii pacientului la riscul de sângeare și evitarea sângeărărilor majore, hemofilia dobândită trebuie recunoscută prompt.
- În caz de prelungire izolată, confirmată, a timpului de tromboplastină parțial activat (aPTT), cu sau fără sângeare, trebuie avută în vedere hemofilia dobândită.
- Pacienții cu diagnostic confirmat de hemofilia dobândită trebuie luati în evidență și tratați de către specialiști. Totodată, trebuie întreruptă administrarea clopidogrelului și trebuie evitate procedurile invazive.

Informațiile furnizate în această comunicare au fost evaluate și aprobată de către Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) și Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale.

Informatii suplimentare privind siguranța

Hemofilia A dobândită este o boală autoimună foarte rară. În literatură, incidența acesteia este estimată la 1 până la 4 cazuri apărute la un milion de pacienți pe an. Morbiditatea și mortalitatea sunt crescute deoarece se asociază adesea cu vîrstă înaintată a pacienților, cu bolile preexistente, cu sângeărările și efectul toxic al tratamentului imunosupresor.

De la punerea medicamentului pe piață, companiei sanofi i s-au comunicat sau s-au publicat în literatură, 11 cazuri de apariție a hemofiliei A dobândite și a unui caz de hemofilia B dobândită, asociate tratamentului cu clopidogrel:

- Aceste cazuri au implicat 8 bărbați, 2 femei, iar pentru 2 dintre pacienți nu s-a comunicat sexul.
- Intervalul de vîrstă a fost cuprins între 65 și 81 de ani.
- Perioada până la debut (momentul raportărilor) a fost cuprinsă între câteva zile și 4 luni de la începerea tratamentului cu clopidogrel.
- Au existat 2 cazuri în care viață a fost pusă în pericol și niciun caz nu a avut evoluție letală.
- La 5 din 8 pacienți la care au existat informații privind evoluția, reacția s-a atenuat după întreruperea administrării clopidogrelului și administrarea tratamentului corectiv.

Pet. 4.4 (atenționări și precauții speciale pentru utilizare) din rezumatul caracteristicilor produsului (vezi anexate informațiile complete despre medicament), inclus în Informațiile despre medicament, a fost actualizat cu informații referitoare la acest risc.

Hemofilia dobândită

S-au raportat cazuri de apariție a hemofiliei dobândite după utilizarea de clopidogrel. În cazurile de prelungire izolată, confirmată, a timpului de tromboplastină parțial activat (APTT), cu sau fără săngerare, trebuie avută în vedere hemofilia dobândită. Pacienții cu diagnostic confirmat de hemofilia dobândită trebuie luati în evidență și tratați de către specialiști, iar administrarea clopidogrelului trebuie întreruptă.

Dat fiind numărul foarte mic de raportări de apariție a hemofiliei dobândite în contextul unei utilizări pe scară foarte mare (peste 153 milioane de pacienți la nivel mondial), se consideră că raportul beneficiu/risc al clopidogrelului rămâne nemodificat pentru indicațiile terapeutice aprobate (vezi anexate detalii complete privind indicațiile):

Clopidogrelul este indicat pentru prevenirea accidentelor aterotrombotice în caz de infarct miocardic, accident vascular cerebral ischemic, arteriopatie obliterantă a membrelor inferioare dovedită, sindrom coronarian acut, inclusiv infarct miocardic acut fără supradenivelare de segment ST și angină instabilă, și infarct miocardic acut cu supradenivelare de segment ST în asociere cu acid acetilsalicilic, la pacienții tratați medical, eligibili pentru tratamentul trombolitic. De asemenea, clopidogrelul este indicat în asociere cu acidul acetilsalicilic pentru prevenirea accidentelor aterotrombotice și tromboembolice la pacienții cu fibrilație atrială, care nu pot fi tratați cu un antagonist al vitaminei K. Asocierea în doză fixă de clopidogrel și acid acetilsalicilic este indicată pentru prevenirea evenimentelor aterotrombotice la pacienții care deja utilizează clopidogrel și acid acetilsalicilic pentru infarct miocardic fără supradenivelare de segment ST, angină pectorală instabilă sau infarct miocardic cu supradenivelare de segment ST, la pacienții tratați medical, eligibili pentru tratamentul trombolitic.

Informații suplimentare

Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul Agenției Europene a Medicamentului, la adresa web: <http://www.ema.europa.eu>.

Apel la raportarea de reacții adverse

Profesioniștii din domeniul sănătății trebuie să raporteze orice reacție adversă suspectată asociată cu administrarea de clopidogrel către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (www.anm.ro), în conformitate cu sistemul național de raportare spontană, prin intermediul „Fișel pentru raportarea spontană a reacțiilor adverse la medicamente”, disponibilă pe pagina web a Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (www.anm.ro), la secția Medicamente de uz uman/Raportcază o reacție adversă,

sau prin fax către:

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale
Centrul Național de Farmacovigilență
Str. Aviator Sănătescu, Nr. 48, Sector 1, București, România
Tel: + 4 0757 117 259
Fax: +4 0213 163 497

Totodată, reacțiile adverse suspectate se pot raporta și către reprezentanța locală a deținătorului autorizației da punere pe piață, la următoarele date de contact:

sanofi-aventis România S.R.L., Str. Izvor, nr. 80, etajele 6-11, sector 5, București, Tel: +40 (0) 21 317 31 36, Fax: +40 (0) 21 317 31 34, e-mail: pv.ro@sanofi.com.

Informatii cu privire la comunicare

Pentru întrebări și informații suplimentare, vă rugăm să contactați Departamentul Medical al companiei Sanofi-Aventis:

sanofi-aventis România S.R.L.
Str. Izvor, nr. 80, etajele 6-11, sector 5, București
Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Cu stima,

Dr. Ovidiu SALTAS-DABIJA
Director Medical și RA sanofi-aventis România S.R.L.

Anexe

1. Textul revizuit al informațiilor despre medicament (rezumatul caracteristicilor produsului)
2. Bibliografie din literatura de specialitate:
 - Collins PW. Management of acquired haemophilia A. J Thromb Haemost 2011; 9 (Suppl. 1): 226-235.
 - Haj M, Dasani H, Kundu S, Mohite U, Collins PW. Acquired haemophilia A may be associated with clopidogrel. BMJ 2004;329(7461):323
 - Huth-Kühne A et al. International recommendations on the diagnosis and treatment of patients with acquired hemophilia A. Haematologica 2009; 94:566-752.
 - Knobla P, Marco P, Baudo P, Collins P, Huth-Kühne A, Nemes L, Pellegrini F, Tengborn L, Lévesque H; EACH2 Registry Contributors. Demographic and clinical data in acquired hemophilia A: results from the European Acquired Haemophilia Registry (EACH2). J Thromb. Haemost. 2012 Apr; 10(4): 622-31