

## **COMUNICARE DIRECTĂ CĂTRE PROFESIONIȘTII DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII**

Decembrie 2020

### **Metamizol: Risc de leziuni hepatice induse medicamentos**

Stimate profesionist din domeniul sănătății,

Deținătorii autorizațiilor de punere pe piață (DAPP) pentru medicamentele care conțin metamizol, de comun acord cu Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) și cu Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR), doresc să vă informeze cu privire la următoarele:

#### *Rezumat*

- Au fost raportate cazuri de leziuni hepatice induse medicamentos (drug-induced liver injury – DILI), asociate cu administrarea de metamizol.
- Vă rugăm să instruiți pacienții cu privire la următoarele aspecte:
  - cum să recunoască simptomele precoce sugestive pentru leziuni hepatice induse medicamentos,
  - să opreasă utilizarea de metamizol în cazul apariției acestor simptome și să solicite asistență medicală pentru evaluarea și monitorizarea funcției hepatice.
- Administrarea de metamizol nu trebuie reluată la pacienții care au prezentat un episod de leziune hepatică în timpul tratamentului cu metamizol, în situația în care la acești pacienți nu s-a identificat nicio altă cauză pentru apariția leziunii hepatice.

Informațiile de siguranță conținute la punctele 4.4. ("Atenționări și precauții speciale pentru utilizare") și 4.8. ("Reacții adverse") din Rezumatul Caracteristicilor Produsului (RCP), precum și cele din Prospect vor fi actualizate în consecință.

### ***Informații suplimentare referitoare la problema de siguranță***

Metamizol este un derivat de pirazonă non-opioid cu proprietăți analgezice și antipiretice puternice și proprietăți antiinflamatorii slabe, „care este indicat de la vîrstă de 3 luni la pacienții cu greutatea de cel puțin 5 kg pentru tratamentul durerii și febrei severe sau rezistente”. [A se vedea Anexa 1 pentru indicațiile terapeutice aprobate la nivel național pentru fiecare DAPP care comercializează metamizol în România].

Metamizol este disponibil, de asemenea, și sub formă de combinații în doză fixă [A se vedea Anexa 1 pentru combinațiile în doză fixă cu metamizol, precum și pentru indicațiile terapeutice aprobate la nivel național ale acestora].

Informațiile noi identificate recent privind leziunile hepatice au determinat o revizuire completă a datelor asociate cu potențialul metamizolului de a determina DILI. În timpul revizuirii, Comitetul EMA pentru evaluarea riscurilor în materie de farmacovigilanță (Pharmacovigilance Risk Assessment Committee = PRAC) a luat în considerare informațiile din toate sursele disponibile, inclusiv rapoartele de reacții adverse la medicamente și studiile publicate în literatura științifică.

S-a observat că leziunile hepatice sunt predominant de tip hepatocelular, cu debut de la câteva zile până la câteva luni de la inițierea tratamentului. Semnele și simptomele au inclus niveluri crescute ale enzimelor hepatice, asociate sau nu cu icter, frecvent în contextul altor reacții de hipersensibilitate la medicamente (de exemplu, erupții cutanate tranzitorii, discrazii sanguine, febră și eozinofilie) sau însușite de caracteristici ale hepatitei autoimune. La unii pacienți, leziunile hepatice au reapărut la reluarea administrării.

Mecanismul leziunilor hepatice induse de metamizol nu este pe deplin cunoscut, dar datele disponibile indică un mecanism imunoalergic.

În general, leziunile hepatice induse medicamentos pot evoluă către forme potențial grave, cum este insuficiența hepatică acută care necesită transplant hepatic.

Pe baza experienței cumulative cu metamizol, de după punerea pe piață a acestuia, experiență de aproape 100 ani, precum și pe baza gradului de expunere a pacienților la acest medicament, apariția leziunilor hepatice cauzate de metamizol este considerată a fi foarte rară, dar frecvența exactă nu poate fi calculată.

Este esențială recunoașterea precoce a leziunilor hepatice potențiale determinate de utilizarea metamizolului. Pacienților trebuie să li se recomande să fie vigilanți în ceea ce privește apariția simptomelor de leziuni hepatice potențiale și să fie încurajați să oprească utilizarea metamizolului și să se adreseze unui medic în cazul în care apar astfel de simptome. Profesioniștii din domeniul

sănătății sunt sfătuți să evalueze și să monitorizeze funcția hepatică la pacienții care se prezintă cu semne și simptome care sugerează orice leziune hepatică.

Reexpunerea la metamizol nu este recomandată în cazul unui episod anterior de leziune hepatică apărut în timpul tratamentului cu metamizol, leziune hepatică pentru care nu a fost determinată nicio altă cauză.

***Apel la raportarea de reacții adverse***

Este important să raportați orice reacție adversă suspectată, asociată cu administrarea de metamizol, către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, în conformitate cu sistemul național de raportare spontană, utilizând formularele de raportare disponibile pe pagina web a Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România ([www.anm.ro](http://www.anm.ro)), la secția Medicamente de uz uman/Raportează o reacție adversă.

**Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România**

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478-RO, România

Fax: +4 0213 163 497

E-mail: [adr@anm.ro](mailto:adr@anm.ro)

[www.anm.ro](http://www.anm.ro)

Raportare online la link-ul următor: <https://adr.anm.ro/>

Totodată, reacțiile adverse suspectate se pot raporta și către reprezentanțele locale ale deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață (DAPP), utilizând datele de contact prezentate în Anexa 1.

***Coordonatele de contact ale reprezentanțelor locale ale deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață***

Pentru întrebări și informații suplimentare vă rugăm să contactați companiile farmaceutice, utilizând datele de contact prezentate în Anexa 1.

***Anexe***

**Anexa 1 - Coordonatele de contact ale reprezentanțelor locale ale Deținătorilor de Autorizație de Punere pe Piață care comercializează metamizol în România**

**Anexa 1 - Coordonatele de contact ale reprezentanțelor locale ale Dejinatorilor de Autorizație de Punere pe Piață care comercializează metamizol în România**

Dejinatorul autorizat de punere pe piață	Denumirea produs, concentrație și formă farmaceutică	DCI	Cale de administrare	Indicații aprobată	E-mail	Telefon	Fax	Reprezentant Locală	Nume reprezentant Dejinator autorizat de punere pe piață
SOPHARMA AD, Bulgaria	Metamizol iodic PMI 500 mg/ml soluție injectabilă	METAMIZOLUM Natrium	Injecție intramusculară sau intraveneoză (lemn)	Acești medicamente sunt indicat la adulți și adolescenți cu vârstă de peste 15 ani pentru ameliorarea pe termen scurt a dureroi acute severe de diverse etiologii, cum ar fi: - dureri severe acute post-traumatică sau post -operatorie; - colici; - dureri de origine tumorali; - alte dureri severe acute sau cronice, atunci când alte metode de terapie sunt contraindicate; Ca agent antiinflamator în tratamentul complex al diferitelor afecțiuni, inclusiv de febră, care nu răspunde la alte terapii. Administrația parenterală este indicată numai atunci când administrația orală nu este o alternativă.	farmacoclienta@farmaceuroconsult.eu pharmacoglanz@farmaceuroconsult.eu	+40749195240	NA	Pharma Euroconsult SRL, Str. Costă Nr.8A, Bl.432, Sc.A, Ap.4, Et.1, Sector 3, București, Cod postal 032731, Tel.: +0749195240, Email: Egeorgescu@farmaceuroconsult.com	Gabriel Georgescu
NOVOCALMIN 500 mg, comprimate	METAMIZOLUM Natrium		Orală	Dureri acute severe postoperatorii sau posttraumatici colici; dureri de cauză tumorali; alte dureri severe acute sau cronice, atunci când alte mijloace terapeutice nu sunt indicate. Combaterea febrei, atunci când aceasta este refractară la alt tratament	mihaielamonea@antibiotice.ro cristina.pallos@antibiotice.ro liliamedușan@antibiotice.ro	+40 710 633 164 +40 232 209 000 +40 372 065 000	+40 372 065 633	Antibiotice SA, România Str. Valea Lupului nr. 1, 707410, Iași Tel.: +40 372 209 000; +40 372 065 000 Fax.: +40 232 209 633	Dr. Mihaela Moșneagu
ANTIBIOTICE SA	NOVOCALMIN 300 mg, supozitoare	METAMIZOLUM Natrium	Rectală	Dureri acute severe postoperatorii; colici; dureri de cauză tumorali; alte dureri severe acute sau cronice, atunci când alte mijloace terapeutice nu sunt indicate. Combaterea febrei, atunci când aceasta este refractară la alt tratament.	mihaielamonea@antibiotice.ro cristina.pallos@antibiotice.ro liliamedușan@antibiotice.ro	+40 710 633 164 +40 232 209 000 +40 372 065 000	+40 372 065 633	Antibiotice SA, România Str. Valea Lupului nr. 1, 707410, Iași Tel.: +40 372 209 000; +40 372 065 000 Fax.: +40 232 209 633	Dr. Mihaela Moșneagu
SANTA S.A.	PIAFEN 500 mg, 5 mg, 0,1 mg, comprimate	COMBINATII: metamizol iodic, clorhidrat de pitaleton, bromometilat de temipramidă	Orală	Tratamentul durerilor moderate [cefalee, dureri dentare, colici bilare și renale, cistiguri, dismenoree, dureri postoperatorii și posttraumatici]	mihaielamonea@antibiotice.ro cristina.pallos@antibiotice.ro liliamedușan@antibiotice.ro	+40 710 633 164 +40 232 209 000 +40 372 065 000	+40 372 065 633	Antibiotice SA, România Str. Valea Lupului nr. 1, 707410, Iași Tel.: +40 372 209 000; +40 372 065 000 Fax.: +40 232 209 633	Dr. Mihaela Moșneagu
ALGIOTOP 500 mg, comprimate	METAMIZOLUM Natrium		Orală	Dureri acute severe postoperatorii sau posttraumatici; colici; dureri de cauză tumorali; alte dureri severe acute sau cronice, atunci când alte mijloace terapeutice nu sunt indicate. Combaterea febrei, atunci când aceasta este refractară la alt tratament	sorana.merinde@iamantaharm.eu farmacoclienta@santapharm.ro nandor.santa@santapharm.ro	+40364010925 +40746229888	+4036401093	S.C. SANTA S.A. Str. Carpătită, nr. 83/B5, spațiu comercial V-paturi comodă, București, 1, Brătești, județul Brăila, cod 500269, România; Tel.: +40 368 401 092 Fax.: +40 368 401 093 Email: farmacovigilenta@santapharm.eu	Dr. Nandor Santa

**Aneata 1 - Coordonatele de contact ale reprezentanților locali ale Reședinților de Autoritate de Punere pe Plată care comercializează metamizol în România**

Deținătorul autorității de punere pe piață	Denumirea produsului și forma farmaceutică	DCI	Cale de administrare	Indicații aprobată	E-mail	Telefon	Fax	Reprezentanța locală	Nume reprezentant
FARMACOM SA	METAMIZOL FARMACOM 500 mg, comprimate	METAMIZOLUM NATHRUM	Oraș	Dureri acute severe postoperatorii sau postoperatori; colică dureri de cauă tumorată; alte dureri severe acute sau cronice, atunci când alte mijloace terapeutice nu sunt indicate. Combaterea febrei, atunci când aceasta este refractară la alt tratament.	office@farmacom.ro	+40 268 331 114	+40 268 330 864	Farmacom S.A.	Reka Balas
LAROPHARM S.R.L.	ALINDOR 500 mg, comprimate	METAMIZOLUM NATHRUM	Oraș	- Dureri acute severe, postoperatorii sau postoperatori; colică, dureri de cauă tumorată, alte dureri severe acute sau cronice, atunci când alte mijloace terapeutice nu sunt indicate. - Combaterea febrei, atunci când aceasta este refractară la alt tratament.	farmacotellent@farmacotellent.ro	+40 021 369 32 02	+40 021 369 32 06	S.C. Laropharm S.R.L.	Adresă: Josseau Alexandriei, nr. 145A, Bragadiru, 070925, Ilfov, România Tel: +40 749 405 438; +40 734 222 982 E-mail: farmacovigilenta@laropharm.ro Reprezentant Stat: Raluca Staili Farm. Raluca Staili
ZENTIVA S.A.	ALGOCALMIN 500 mg, comprimate	METAMIZOLUM NATHRUM	Oraș	Dureri acute severe postoperatorii sau postoperatori; colică, dureri de cauă tumorată, alte dureri severe acute sau cronice, atunci când alte mijloace terapeutice nu sunt indicate. Combaterea febrei, atunci când aceasta este refractară la alt tratament.	zentiavr@zentiva.com	+40 021 304 7597	+40 021 345 4004	Zentiva S.A Romania Str. Theodor Pallady, nr.50 București, Sector 3 Tel: +40 021 304 7597 Fax: +40 021 345 4004 e-mail: zentiavr@zentiva.com Ileana Nică Ileana Gherghe	Ileana Nică Ileana Gherghe
ZENTIVA S.A.	ALGOCALMIN 1 g/2 ml, soluție injectabilă	METAMIZOLUM NATHRUM	Injeție intramusculară sau intravenoasă lentă	Dureri acute și severă după operații și traumatisme, dureră din colică, dureri asociate cu tumori și alte dureri severe, acile sau cronice, când nu sunt indicate alte tratamente. De asemenea, metamizolul este indicat împotriva febrei, când aceasta este refractară la alte tratamente.	zentivard@zentiva.com	+40 021 304 7597	+40 021 345 4004	Zentiva S.A Romania Str. Theodor Pallady, nr.50 București, Sector 3 Tel: +40 021 304 7597 Fax: +40 021 345 4004 e-mail: zentiavr@zentiva.com Ileana Nică Ileana Gherghe	Ileana Nică Ileana Gherghe
ZENTIVA S.A.	ALGIFEN 500 mg/2 mg/ml, soluție injectabilă	COMBINATII: metamizol sodiu, clorhidrat de pitofenona, bromometat de fenilpirimidă	Injecție intramusculară profund sau intravenos	Tratamentul simptomatic al sindromelor aiguice intense insotite de spasmuri ale mușchilor netedă; colică renală, colică biliară, pancreatita cronica, cistalgi, colică, dismenore, De astemenea, este recomandat în tratamentul durerilor postoperatorii și posttraumatice intense, în migrene.	zentivard@zentiva.com	+40 021 304 7597	+40 021 345 4004	Zentiva S.A Romania Str. Theodor Pallady, nr.50 București, Sector 3 Tel: +40 021 304 7597 Fax: +40 021 345 4004 e-mail: zentiavr@zentiva.com Ileana Nică Ileana Gherghe	Ileana Nică Ileana Gherghe

**Anexa 1 - Coordonatele de contact ale reprezentanților locale ale Dilegătorilor de Autoritate de Puncere pe Plată care comercializează metamisol în România**

Dilectorul autorizat de puncere pe plată	Denumire produs, concentrație și formă farmaceutică	DO	Cale de administrare	Indicații aprobată	E-mail	Telefon	Fax	Reprezentanța Locală	Nume reprezentant Dilector autorizat de puncere pe plată
ALGOFEN 500 mg/5 mg/0,1 mg, comprimate	COMBINATII: metamisol sodic, clohidrat de pilofenon, bromură de feripentină	Orale	Tratamentul simptomatic al sindromelor algești înalte de spasm ale mușchilor și articulațiilor: colică renală, distinea hepato-bilare, pancreatită cronica, cistici, colică, dismenoză. De asemenea, este recomandat în tratamentul durerilor postoperatorii și posttraumatice, în cedele, migrene, odontalgi.	Zentiva Srl Romania zentivahq@zentiva.com	+40 021.304.7597	[+40] 021.345.4004	Sr. Theodor Pallady, nr. 50 București Sector 3 Tel: +40 021.304.2797 Fax: +40 021.345.4004 e-mail: zentivarD@zentiva.com	Zentiva Srl Romania Sr. Theodor Pallady, nr. 48 București Sector 3 Tel: +40 021.318.0377 Fax: +40 021.318.0376 e-mail: inform Romania@zentiva.com Ileana Nicăla Raducanu	Ileana Nicăla Liliana Gherghé
ALGOZONE 500 mg, comprimate	METAMIZOLUM Natrium	Orale	Dureri acute severe postoperatorii sau posttraumatice, colici durează de cinci minute, alte dureri severe acute sau cronice, atunci când îl înlocuiează terapiea nu sunt indicate. Combinarea febrilă, atunci când aceasta este refractară la alt tratament.	Inferromania@zentiva.com	+40 021.318.0377	[+40] 021.318.0376	S.C. STADA MED S.R.L. Adresa: Sit St. Elefterie, nr. 18, Partea A, Et. 1, Sector 5, București Romania Tel: +40 21.326.06.38 Fax: +40 744.560.318 +40 751.219.156 antonela.mazalui@hemofarm.com E-mail: Ionescu@stada.ro	S.C. STADA MED S.R.L. Str. Gara Herastrau, nr. 4, Clădirea B, etajele B și C, Sector 5, București Romania Tel: +40 021.317.31.36 Fax: +40 021.317.31.34 e-mail: pr.v@sanofi.com mena.ciara@sanofi.com	Dr. Antonela Mazalui Dr. Loredana Petcu
EDOCAMIN 500 mg/ml, plășă orală, soluție	METAMIZOLUM Natrium	Orale	Dureri severă acută, post-traumatică sau post-operatorie; colic durerioase; dureri de origine tumorală; alte dureri severe, acute sau cronice, atunci când alte mijloace terapeutice sunt contraindicate; febră mare, care nu răspunde la alte mijloace terapeutice	antozania.mazalui@hemofarm.com erilice@ionescu@stada.ro	+40 21.316.06.40 +40 744.560.318 +40 751.219.156	Sanofi Romania SRL Str. Gara Herastrau, nr. 4, Clădirea B, etajele B și C, Sector 5, București Romania Tel: +40 021.317.31.36 Fax: +40 021.317.31.34 e-mail: pr.v@sanofi.com mena.ciara@sanofi.com			
QUARELIN 400mg/50mg/40 mg, comprimate	COMBINATII: metamisol sodic, calein și clorhidrat de drozaverină	Orale	Cefaleea severă sau rezistentă, fară inițială și stăcăuitor migrenosă și/ sau și moderată	pr.v@sanofi.com	+40 21.317.31.36	[+40] 21.312.31.34	TIS FARMACEUTIC S.A., Str. Industrială nr. 15, sector 3, București, România E-mail: office@tisfarmaceutic.ro Tel/Fax: +40 21.256.30.98		
TIS FARMACEUTIC S.A.	TSIAGIN 300 mg, supozita	Rectală	Dureri acute severe postoperatorii sau posttraumatice; colici durează de cinci minute, alte dureri severe acute sau cronice, atunci când alte mijloace terapeutice nu sunt indicate. Combinarea febrilă, atunci când aceasta este refractară la alt tratament.	farmaco@tisfarmaceutic	+40 722.250.050	+40 21.256.30.98	Sr. Ana Ofișan Kruspilsela 33, R.F.D. LV-1057, Letonia Tel: +371.670.83320 E-mail: kallek@kalceks.lv		
AS KALCEKS	Metamisol Kalced 500 mg/mi soluție injectabilă	Intravenoasă, Intramusculară	Dureri acute severe sau durere cronica. Febră care nu răspunde la alt tratament.	kallek@kalceks.lv	+371.570.83320	NA	Kruspilsela 33, R.F.D. LV-1057, Letonia Tel: +371.670.83320 E-mail: kallek@kalceks.lv	Mira Source	