

# FIȘĂ DE CONTINUARE A TRATAMENTULUI CU ORLISTATUM (XENICAL) PENTRU PACIENTUL CU TULBURĂRI DE NUTRIȚIE ȘI METABOLISM

## I. Date de identificare

a. Numele și prenumele pacientului \_\_\_\_\_

Data nașterii (zi, luna, an) \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_

Domiciliul \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_

b.

Diagnostic: obezitate \_\_\_\_\_ / comorbidități \_\_\_\_\_

c. Părinte sau susținător legal ( numele ) \_\_\_\_\_

Calitatea \_\_\_\_\_ Domiciliul \_\_\_\_\_

d. Medic curant (numele și prenumele) \_\_\_\_\_

Specialitatea \_\_\_\_\_ instituția (denumirea, adresa, telefon/fax,  
e-mail) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

e. Medic de familie (nume și prenume) \_\_\_\_\_

Unde poate fi contactat \_\_\_\_\_

## II. Criterii de evaluare a eficacității terapeutice în monitorizarea pacienților aflați în tratament cu Orlistatum

Reevaluările pentru monitorizarea pacienților din programul terapeutic cu Orlistatum vor fi efectuate de un *medic endocrinolog sau diabetolog*, numit *medic curant*.

**1. Perioadele de timp la care se face evaluarea (monitorizarea sub tratament):**  
La intervale de 3 luni sau mai des în cazul apariției reacțiilor adverse și vor cuprinde:

• **Caracteristicile antropometrice:**

<b>Indici antropometrici</b>	<b>Valori la 3 luni/Data</b>	<b>Valori la 6 luni/Data</b>	<b>Valori la 9 luni/Data</b>	<b>Valori la 12 luni/Data</b>
greutatea corporala				
circumferința taliei				
circumferința soldurilor				
raportul talie/șold				

• **Biochimie generală:**

<b>Parametri biologici</b>	<b>Valori la 3 luni/Data</b>	<b>Valori la 6 luni/Data</b>	<b>Valori la 9 luni/Data</b>	<b>Valori la 12 luni/Data</b>
Glicemia bazală				
Testul oral de toleranță la glucoză la pacienții cu suspiciune de diabet zaharat				
Hemoglobina glicozilată la pacienții diabetici				
Colesterol total				
HDL-colesterol				
LDL-colesterol				
Trigliceride serice				
TGO				
TGP				

• EKG, consult cardiologic: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**2. Criterii de eficacitate terapeutică (criterii de control terapeutic optim):**

• **Doza de întreținere de Orlistatam: o capsulă de 120 mg de 3 ori/zi**

- Scădere ponderală cu minim 5% după 6 luni de tratament și cu minim 10% după 12 luni de tratament:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- Ameliorarea parametrilor metabolici – diabet zaharat, dislipidemie, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- Controlul optim al eventualelor complicații cardio-respiratorii \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### **3. Criterii de ineficiență terapeutică (necesită reevaluarea complianței la tratamentul medicamentos și la modificarea stilului de viață):**

- Lipsa scăderii ponderale sau scădere ponderală insuficientă (scădere ponderală sub 5% după 6 luni de tratament și sub 10% după 12 luni de tratament):

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

- Evoluția complicațiilor: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### **III. Criteriile de nonincludere în tratament și/sau de întrerupere a tratamentului cu Orlistatum**

#### **Se bifează motivul/motivele:**

- alergii
- pacientele însărcinate sau care alăptează
- afectare renală
- afectare hepatică sau colestatică (de altă etiologie decât cea steatozică)
- afectare gastrointestinală (sindroame de malabsorbție)
- afectare pulmonară (cu excepția astmului bronșic sau a apneei de somn)
- Pacienți care nu întrunesc nici un criteriu de eficiență terapeutică de la punctul II.2:

---

---

---

- Apariția reacțiilor adverse: \_\_\_\_\_

---

- Complanța scăzută la tratament și monitorizare: \_\_\_\_\_

---

---

- Încheierea a 12 luni de tratament: \_\_\_\_\_

---

Data \_\_\_\_\_ Semnătura și parafa \_\_\_\_\_