

Octombrie 2018

COMUNICARE DIRECTĂ CĂTRE PROFESIONIȘTII DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII

Fluoroquinolonele sistemice și inhalatorii: risc de anevrism aortic și disecție aortică

Stimate profesionist din domeniul sănătății,

De comun acord cu Agentia Europeană pentru Medicamente (EMA) și Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, deținătorii autorizațiilor de punere pe piață pentru fluoroquinolonele doresc să vă informeze cu privire la adăugarea unei noi atenționări privind riscul de anevrism aortic și disecție aortică asociate cu utilizarea de fluoroquinolone cu administrare pe cale sistemică și pe cale inhalatorie.

Rezumat

- Fluoroquinolonele sistemice și inhalatorii pot determina creșterea riscului de anevrism aortic și disecție aortică, în special la persoanele vîrstnice.
- La pacienții cu risc de anevrism aortic și disecție aortică, fluoroquinolonele trebuie utilizate numai după o evaluare atentă a raportului beneficiu/risc și după luarea în considerare a altor opțiuni terapeutice.
- Afectionile care predispun la anevrism aortic și disecție aortică includ antecedentele familiale de boală anevrismală, preexistența anevrismului aortic sau a disecției aortice, sindromul Marfan, sindromul vascular Ehlers-Danlos, arteritei Takayasu, arteritei cu celule gigant, bolii Behçet, hipertensiunii arteriale și atherosclerozei.
- Pacienții trebuie avertizați cu privire la riscul de anevrism aortic și disecție aortică și trebuie informați să solicite imediat asistență medicală la unitatea de primiri urgențe în caz de durere severă la nivel abdominal, toracic sau dorsal apărută brusc.

Informații suplimentare referitoare la problema de siguranță și recomandările respective

Fluoroquinolonele sunt antibiotice autorizate în Uniunea Europeană pentru tratamentul mai multor infecții bacteriene, inclusiv unele care pun viața în pericol.

Date din studiile epidemiologice și non-clinice indică un risc crescut de anevrism aortic și disecție aortică după tratamentul cu fluoroquinolone.

În studiile epidemiologice [1-3] s-a raportat o creștere de aproximativ 2 ori a riscului de anevrism aortic și disecție aortică la pacienții care iau fluoroquinolone sistemice în comparație cu pacienții care nu iau antibiotice sau care iau alte antibiotice (amoxicilină); persoanele vârstnice prezintă un risc mai crescut.

Într-un studiu non-clinic [4] s-a raportat faptul că ciprofloxacina crește susceptibilitatea de apariție a disecției aortice și rupturii aortice într-un model la șoarece. Această constatare este probabil un efect de clasă, similar cu efectul nociv al fluoroquinolonelor asupra țesutului tendinos și, prin urmare, cresc riscul de afectare a tendoanelor.

Anevrismul aortic și disecția aortică sunt evenimente rare, care apar cu o incidență de aproximativ 3-30 din 100.000 de persoane pe an. Factorii care determină creșterea riscului includ antecedentele familiale de boală anevrismală, preexistența anevrismului aortic sau a disecției aortice, sindromului Marfan, sindromului vascular Ehlers-Danlos, arteritei Takayasu, arteritei cu celule gigant, bolii Behçet, hipertensiunii arteriale și atherosclerozei.

Prin urmare, la pacienții cu risc de anevrism aortic și disecție aortică, fluoroquinolonele trebuie utilizate numai după o evaluare atentă a raportului beneficiu/risc și după luarea în considerare a altor opțiuni terapeutice.

Pacienții trebuie avertizați cu privire la acest risc și trebuie informați să solicite imediat asistență medicală în cazul unei dureri apărute brusc la nivel abdominal, toracic sau dorsal.

Apel la raportarea de reacții adverse

Este important să raportați orice reacție adversă suspectată, asociată cu administrarea fluoroquinolonelor, către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, în conformitate cu sistemul național de raportare spontană, utilizând formularele de raportare disponibile pe pagina web a Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale (www.anm.ro), la secțiunea Raportează o reacție adversă.

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478-RO

Tel: +4 021 317 11 10

Fax: +4 021 316 34 97

e-mail: adr@anm.ro

www.anm.ro

Totodată, reacțiile adverse suspectate se pot raporta și către reprezentanțele locale ale deținătorilor autorizațiilor de punere pe piață (DAPP), la date de contact prezentate în Anexa 1.

Coordonatele de contact ale reprezentanțelor locale ale Deținătorilor de autorizație de punere pe piață

Pentru întrebări și informații suplimentare vă rugăm să contactați companiile farmaceutice, utilizând datele de contact prezentate în Anexa 2.

Reference

- [1] Daneman N, Lu H, Redelmeier DA. Fluoroquinolones and collagen associated severe adverse events: a longitudinal cohort study. *BMJ Open*. 2015 Nov 18; 5(11):e010077
- [2] Lee CC, Lee MT, Chen YS, Lee SH, Chen YS, Chen SC, Chang SC. Risk of Aortic Dissection and Aortic Aneurysm in Patients Taking Oral Fluoroquinolone. *JAMA Intern Med*. 2015 Nov;175(11):1839-47.
- [3] Pasternak B, Inghammar M and Svanström H. Fluoroquinolone use and risk of aortic aneurysm and dissection: nationwide cohort study. *BMJ* 2018; 360: k678.
- [4] LeMaire SA, Zhang L, Luo W, Ren P, Azares AR, Wang Y, Zhang C, Coselli JS, Shen YH. Effect of Ciprofloxacin on Susceptibility to Aortic Dissection and Rupture in Mice. *JAMA Surg*. 2018 Sep 1;153(9):e181804. [Epub ahead of print]

Anexa I - Date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate

Denumire medicamente	DAPP	Email farnacovigilanță România	Telefon de contact	Fax
NORFLOXACIN HELCOR 400 mg, comprimate filmate	ACHELCOR PHARMA SRL, Romania	office@achelcor.ro	0362-401206	0362-401207
CIPROLEN® 250 mg, comprimate filmate CIPROLEN® 500 mg, comprimate filmate	ACHELCOR SRL, Romania	office@achelcor.ro	0362-401206	0362-401207
Levofloxacina ACTAVIS 250 mg comprimate filmate Levofloxacina ACTAVIS 500 mg comprimate filmate Levofloxacina ACTAVIS 5 mg/ml soluție perfuzabilă MORF 400 mg comprimate filmate	ACTAVIS GROUP PTC EHF – ISLANDA	safety.romania@teva-romania.ro	021 230 65 24 021 230 65 23	
Cipro Quin 500 mg, comprimate filmate Norfloxacina Arob 400 mg, comprimate filmate Ciprofloxacina® Aurobindo 250 mg comprimate filmate Ciprofloxacina Aurobindo 500 mg comprimate filmate	ANTIBIOTICE SA	sigreduimare@antibiotice.ro	+40 232 209 249 +40 232 209 256	+40 372 065 633
		Gabriel.georgescu@aurobindo.com Pharmacovigilance.romania@aurobindo.com	0748191240	

Anexa 1 - Date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate

Ciprofloxacina Aurobindo 750 mg comprimate filmate Moxifloxacina Aurobindo 400 mg comprimate filmate				
Avelox 400 mg comprimată filmată Avelox 400 mg/250 ml soluție perfuzabilă Ciprotag XR 500 mg, comprimată filmată cu eliberare prelungită Ciprotag XR 1000 mg, comprimată filmată cu eliberare prelungită	S.C. BAYER S.R.L.	pharmacovigilance_romania@bayer.com	+40 723 505 648 (24/7) 021.528.59.09	+40 21 528 59 38
Fleraday 500 mg comprimată filmată	Dr. Reddy's Laboratories România SRL	office@drreddys.ro	+40 212240032	+40 212240246
Ciprocin 500 mg Ciprocin 250 mg	E.I.P.I.CO MED S.R.L.	ciproco@eipico.ro	021.337.09.36 021.337.11.91	
Moxifloxacina Kabi 400 mg/250ml soluție perfuzabilă Levofloxacin Kabi 5 mg/ml soluție perfuzabilă	S.C. FRESENIUS KABI ROMÂNIA S.R.L.	farmacovigilanta@fresenius-kabi.com	+40 21 327 70 60	+40 21 323 16 23
CUMINOL 250 mg comprimată filmată CUMINOL 500 comprimată filmată	Gedeon Richter Romania S.A.	pharmacovigilance@gedeon-richter.ro	0040-265-257 011	0040-265-257 011

Anexa 1 - Date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate

Cipro Inf 2mg/ml soluție perfuzabilă	INFOMED FLUIDS SRL	nicolelamaliciu@informedsrlfluids.ro	(+40) 21.345.02.22 (+40) 722550111	(+40) 21.345.31.85
Ciprianol 250 mg comprimate filmate Ciprianol 500 mg comprimate filmate Ciprianol 750 mg comprimate filmate Ciprianol 100 mg/10 ml concentrat pentru soluție perfuzabilă Levatox 250 mg comprimate filmate Levatox 500 mg comprimate filmate Levatox 5 mg/ml soluție perfuzabilă Moflaxa 400 mg comprimate filmate Moflaxa 400 mg/250 mg soluție perfuzabilă Nolicin 400 mg comprimate filmate Norfloxacina LPH 400 mg	S.C. KRKA România S.R.L.	razvan.butte@krka.biz pharmacovigilance.ro@krka.biz	+4021 310 66 05 +4021 310 66 06	+4031 100 07 03
Norfloxacin Laropipharm	Laropipharm	farmacovigilanta@laropipharm.ro	+40 754355544	40 213 69 32 06

Anexa 1 - Date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate

400 mg comprimate filmate Oloxacină Laropiar™ 200 mg comprimate filmate				
Moxifloxacina Rompharm 400mg/250ml soluție perfuzabilă	S.C. ROMPHARM COMPANY S.R.L.	Pharmacovigilance@rompharm.ro	+40 745 144 434 (24/7)	+40 21 350 46 41
Cenomar 5 mg/ml soluție perfuzabilă	STADA Hemofarm SRL	antocanea.mazanu@hemofarm.com	+40 21 316 06 37; +40 21 316 06 39; +40 21 316 06 40 +40 744 560 328	+40 21 316 06 38
Cifran 250mg comprimate filmate Cifran 500mg comprimate filmate Zanocin 200 mg comprimate filmate Tavanic 250 mg comprimate filmate Tavanic 500 mg comprimate filmate Tavanic I.V. 250 mg soluție perfuzabilă Tavanic I.V. 500 mg soluție perfuzabilă	Terapia S.A SUN PHARMA company	romania.office@sunpharma.com	+40 264 501 562	+40 264 415 097
Ofoxin 200 mg comprimate filmate Ciprofloxacina ZENTIVA 10 mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă	ZENTIVA I.c.s. Czech Republic ZENTIVA S.A.	PV-Romania@zentiva.com	021.304.7597	021.345.4004

Anexa 2 - Coordonatele de contact ale reprezentanțelor facute ale Deținătorilor de Autorizație de Punere pe Piață
 Pentru întrebări și informații suplimentare vă rugăm să contactați:

Deținătorul autorizației de punere pe piață	Reprezentanța locală	Denumire produs, concentrație și formă farmaceutică	DCI	Calea de administrare	Semnătura
AC HELCOR SRL, Romania	SC AC HELCOR SRL Str. Dr. Victor Babes nr. 50, 430092, Baia Mare Telefon: 0362-401206 Fax: 0362-4012017 e-mail: office@achelcor.ro	CIPROLEN® 250 mg, comprimate filmate CIPROLEN® 500 mg, comprimate filmate	Ciprofloxacinum	Orală	
AC HELCOR Pharma SRL, Romania	SC AC HELCOR SRL Str. Dr. Victor Babes nr. 50, 430092, Baia Mare Telefon: 0362-401206 Fax: 0362-4012017 e-mail: office@achelcor.ro	NORFLOXACIN HELCOR 400 mg comprimate filmate	Norfloxacinum	Orală	
ACTAVIS GROUP FTC EHF – ISLANDA	Teva Pharmaceuticals SRL, Calea 13 Septembrie nr 90, etaj 9, sector 5, București, Romania Telefon: 021 230 65 24 Fax: 021 230 65 23 e-mail: safety.romania@teva-romania.ro	LEVOFLOXACINA ACTAVIS 250 mg comprimate filmate LEVOFLOXACINA ACTAVIS 500 mg comprimate filmate	Levofloxacinum	orală	
Antibiotice SA, Romania	Antibiotice SA, România Str. Valea Lupului nr. 1, 707410, Iași Tel.: +40 232 209 000; +40 372 065 000 Fax.: +40 232 209 633 e-mail: office@antibiotice.ro email: signsedumane@antibiotice.ro (firma se va vizita)	LEVOFLOXACINA ACTAVIS 5 mg/ml solutie perfuzibila MOFL 400 mg comprimate filmate	Moxifloxacinum	orală intravenoasă	

Auxa 2- Coordonate de contact ale reprezentanților legali ale Definitorilor de Autorizație de Punere pe Piață pentru întrebări și informații suplimentare vă rugăm să contactați:

Aurobindo Pharma România S.R.L., Str. București-Ploiești nr.42-44, etajul 2, Cladirea B, Aripa B2, Complex Băneasa Business & Technology Park S.A sector 1, București, România Farm. Gabriel Georgescu Tel. 0748195240 Gabriel.georgescu@aurobindo.com pharmacovigilance.romania@aurobindo.com	Aurobindo Pharma România S.R.L., Sos. București-Ploiești nr.42-44, etajul 2, Cladirea B, Aripa B2, Complex Băneasa Business & Technology Park S.A sector 1, București, România Farm. Gabriel Georgescu Tel. 0748195240 Gabriel.georgescu@aurobindo.com pharmacovigilance.romania@aurobindo.com	Ciprofloxacină Aurobindo 250 mg comprimate filmate Ciprofloxacină Aurobindo 500 mg comprimate filmate Ciprofloxacină Aurobindo 750 mg comprimate filmate Moxifloxacină Aurobindo 400 mg comprimate filmate	Ciprofloxacinum orală
S.C. BAYER S.R.L. Adresă: Soseaua Pipera, nr. 42, Sector 2, 020112 București, România Tel: + 40 21 528 59 09 Mob: + 40 21 505 648 (24/7) Fax: + 40 21 528 59 38 E-mail: pharmacovigilance_romania@bayer.com	S.C. BAYER S.R.L., România Adresă: Soseaua Pipera, nr. 42, Sector 2, 020112 București, România Tel: + 40 21 528 59 09 Mob: + 40 21 505 648 (24/7) Fax: + 40 21 528 59 38 E-mail: pharmacovigilance_romania@bayer.com	Avelox 400 mg comprimate filmate Avelox 400 mg/250 ml soluție perfiuzabilă	Moxifloxacinum orală Intravenoasă
Dr. Reddy's Laboratories România SRL Str. Nicolae Caranfil nr. 71-73, Etaj 5, Spașul 10, Sector 1 București, România, 014142 office@drreddys.ro	Dr. Reddy's Laboratories România SRL , Str. Nicolae Caranfil nr. 71-73, Etaj 5, Spașul 10, Sector 1 București, România, 014142 office@drreddys.ro	Ciproabay XR 500 mg comprimate filmate cu eliberare prelungită Ciproabay XR 1600 mg , comprimate filmate cu eliberare prelungită	Ciprofloxacinum orală
E.I.P.L.CO MED S.R.L. B-dul Unirii nr.6, Bl.8C sc.1, etaj 3, ap.9, Sector 4, București, România E-mail : eiplco@eiplco.ro	E.I.P.L.CO MED S.R.L. B-dul Unirii nr.6, Bl.8C sc.1, etaj 3, ap.9, Sector 4, București, România E-mail : eiplco@eiplco.ro	Ciproacrin 500 mg Ciproacrin 250 mg	Ciprofloxacinum orală

Anexa 2. Coordonatele de contact ale reprezentanților locale ale Definitorilor de Autorizare de Punere pe Piață

Pentru întreținere și informații suplimentare vă rugăm să consultați:

S.C. FRESENIUS KABI ROMÂNIA S.R.L.	S.C. FRESENIUS KABI ROMÂNIA S.R.L. Adresă: Strada Făneștilor nr. 2A, 500664- Brasov, România Tel.: +40 21 327 70 60 Mob.: +40 722 315 390 (24/7) Fax: +40 21 323 16 23 e-mail: farmacovigilenta@fresenius- kabi.com	Moxifloxacina Kabi 400 mg/250ml soluție perfuzabilă	Moxifloxacinum	intravenoasă
Gedeon Richter România S.A.	Gedeon Richter România S.A. 540306, str. Cuză Vodă nr. 99-105, Târgu Mureș, România Biroul de farmacovigilență Tel: 0040-265-257 011 Fax: 0040-265-257 011 e-mail: pharmacovigilanta@gedeon-richter.ro	CUMINOL 250 mg comprimate filmate CUMINOL 500 comprimate filmate	Ciprofloxacinum	orală
Informed Fluids SRL	INFOMED FLUIDS SRL B-DUL THEODOR PALLADY nr.50, sector 3, 032266, București Tel:(+40) 21 345.02.22 Mob: (+40) 73253011 Fax:(+40) 21 345.31.85 E-mail: nicoleteu.maliciuc@informedfluids.ro	Cipro Inf 2 mg/ml soluție perfuzabilă	Ciprofloxacinum	intravenoasă
S.C. KRKA România S.R.L.	S.C. KRKA România S.R.L. Splaiul Independenței Nr. 319, etaj 10, Sector 6, București Persoana de contact și semnatul CDPDS: Dr. Răzvan Bută Telefon: +40.21.310.66.05 +40.21.310.66.06 Fax: +40.31.1000.703	Ciprianol 250 mg comprimate filme Ciprianol 500 mg comprimate filme Ciprianol 750 mg comprimate filme	Ciprofloxacinum	orală
		Ciprianol 100 mg/10 ml		intravenoasă

Anexa 2 - Coordonatele de contact ale reprezentantelor locale ale Dilemnitorilor de Autorizare de Putere pe Piață
Pentru întrebări și informații suplimentare vă rugăm să contactați:

	E-mail: razvan.bute@kkrta.biz	concentrat pentru soluție perfuzabilă	Norfloxacinum	orală
		Levalox 250 mg comprimate filmate	Levofoxacinum	orală
		Levalox 500 mg comprimate filmate		
		Levalox 5 mg/ml soluție perfuzabilă		întravenoasă
		Moflaxa 400 mg comprimate filmate	Moxifloxacinum	orală
		Moflaxa 400 mg/250 mg soluție perfuzabilă		întravenoasă
		Norflox 400 mg comprimate filmate	Norfloxacinum	orală
Labormed	Labormed Pharma S.ă. Adresa punct de lucru Farmacovigiliență: Bulevardul Theodor Pallady 47B, Sector 3, 012258 București, România Tel: +40 21 354 09 85 Mob: +40 721 203 849 Fax: +40 21 354 09 85 Email: iudita.batinaru@labrogen.com; pharmacovigilance@labrogen.com	Norfloxacină L.P.H 400 mg	Norfloxacinum	orală
Laropharm	S.C. Laropharm S.R.L Adresa: Soseaua Alexandriei, nr. 145A, Bragadiru, 077025, Ilfov, România Tel: + 40 213 69 32 02 Mob: +40 754 353 544 E-mail: farmacovigilenta@laropharm.ro	Norfloxacin Laropharm 400 mg comprimate filmate	Norfloxacinum	orală
S.C. ROMPHARM COMPANY S.R.L.	S.C. ROMPHARM COMPANY S.R.L Adresă: Strada Eroilor 1A, 073100, Ocișeni, Ilfov, România Tel: +40 21 350 46 40 Fax: +40 21 350 46 41 Mob: +40 749 144 434 (247)	Olofoxina Laropharm 200 mg comprimate filmate	Olofoxacinum	
		Pefloxacin Laropharm 400 mg comprimate filmate	Pefloxacinum	
		Moxifloxacină Rompharm 400mg/250ml soluție perfuzabilă	Moxifloxacinum	Întravenoasă

Aneata 2 - Coordonatele de contact ale reprezentanților locale ale Diferențiatorilor de Autorizație de Punere pe Piață
Pentru întrebări și informații suplimentare vă rugăm să contactați:

	E-mail: pianacovajilice@sunpharma.ro			
STADA Hemofarm SRL	STADA Hemofarm SRL București, Spl. Independenței nr.1 Bl. 16, sec.2, et.2, ap.38 Tel. +40 21 316 06 37, 316 06 39, 316 06 40 Fax. +40 21 316 06 38 Mobil. +40 744 510 328 E-mail: antoanelia.mazalui@hemofarm.com	Cefotaxim 5 mg/ml soluție perfuzabilă	Levofloxacinum	întravenosă
Terapis SA a SUN PHARMA company	Terapis SA a SUN PHARMA company Str Fabricii nr 124 Cluj-Napoca, 400632,România Telefon: +40-264-501.502 Fax: +40-264-415.097 E-mail: romania.office@sunpharma.com	CIPRAN comprimate filmate 250mg CIPRAN comprimate filmate 500mg ZANOCH 200 mg comprimate filmate TAVANIC 250 mg comprimate filmate TAVANIC 500 mg comprimate filmate TAVANIC I.V. 250 mg soluție perfuzabilă TAVANIC I.V. 500 mg soluție perfuzabilă	Ciprofloxacinum	orală
ZENTIVA s.r.o. Czech Republic ZENTIVA S.A.	ZENTIVA s.r.o. Str. Theodor Pallady, nr.50 București, Sector 3 Tel: +40 021 304.7597 e-mail: zentivuRO@zentiva.com ileana.nicola@zentiva.com	OFLOXIN 200 mg comprimate filmate CIPROFLOXACINA ZENTIVA 10 mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă	Ofoxacinum	orală