

# FIȘĂ DE INIȚIERE A TRATAMENTULUI CU RIMONABANTUM (ACOMPLIA) PENTRU PACIENTUL CU RISC CARDIOMETABOLIC

## I. Date de identificare

a. Numele și prenumele pacientului \_\_\_\_\_

Data nașterii (zi, luna, an) \_\_\_\_\_ CNP \_\_\_\_\_

Domiciliul \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_

b. Diagnostic: obezitate \_\_\_\_\_ / comorbidități \_\_\_\_\_

c. Părinte sau susținător legal ( numele )

\_\_\_\_\_

Calitatea \_\_\_\_\_

Domiciliul

\_\_\_\_\_

d. Medic curant (numele și prenumele) \_\_\_\_\_

Specialitatea \_\_\_\_\_ instituția (denumirea, adresa,

telefon/fax, e-mail)

\_\_\_\_\_

e. Medic de familie (nume și prenume) \_\_\_\_\_

Unde poate fi contactat \_\_\_\_\_

## II. Criteriile de includere în tratamentul cu Rimonabantum (Acomplia)

### 1. Categoriile de pacienți eligibili pentru tratamentul cu Rimonabantum

Pacienți cu vârstă **de peste 18 ani**, care au **cumulativ** următorii factori majori de risc cardiometabolic:

- Obezitate ( $IMC > 30 \text{ kg/m}^2$ ) cu obezitate abdominală (obiectivată prin circumferința taliei de  $> 88 \text{ cm}$  la femei, respectiv  $> 102 \text{ cm}$  la bărbați)
- Diabet zaharat tip 2
- Dislipidemie aterogenă (HDL - colesterol scăzut  $< 40 \text{ mg/dl}$  la bărbați și  $< 50 \text{ mg/dl}$  la femei; trigliceride crescute  $\geq 150 \text{ mg/dl}$ )

**(primii trei factori de risc cardiometabolic sunt obligatorii)**

- Control glicemic inadecvat sub tratament antidiabetic în monoterapie cu Metformin sau Sulfoniluree
- Hipertensiune arterială TA  $\geq$  130/85 mmHG.

**2. Parametrii de evaluare minimă și obligatorie pentru inițierea tratamentului cu Rimonabantum (evaluări nu mai vechi de 8 săptămâni). Se vor anexa buletinele de analize în original, semnate, parafate și ștampilate de medic:**

**A. Caracteristici antropometrice și date clinice generale:**

- a. Vârsta:
- b. Dovada calității de asigurat:
- c. Greutatea corporală:
- d. Înălțime:
- d. Circumferința taliei:
- e. Indicele de masă corporală:

**B. Sinteza istoricului bolii:**

---

---

---

---

**C. Rezultatele eventualei terapii urmate (terapie standard pentru diabet zaharat tip II, dietă și activitate fizica sau terapie medicamentoasă):**

---

—

---

---

---

---

---

---

---

---

**D. Antecedentele fiziologice și patologice (aparitia și evoluția comorbidităților asociate):**

---

---

---

---

**3. Evaluări (nu mai vechi de 8 săptămâni) obligatoriu prezente în dosarul pacientului pentru inițierea tratamentului cu Rimonabantum (Acomplia). Se anexează buletinele de analize în original, semnate, parafate și ștampilate de medic.**

- Biochimie generală:

<b>Parametri biologici</b>	<b>Valori</b>	<b>Data</b>
Glicemie a jeun, postprandială		
Hemoglobină glicozilată		
Trigliceride		
HDL-colesterol		

- EKG, consult  
cardiologic: \_\_\_\_\_

- Consult psihiatric/psihologic pentru a exclude depresia majoră, doar la indicația medicului curant:  
\_\_\_\_\_
- 
- 
- 
-

---

#### 4. Propunere de includere în tratament

Subsemnatul propun Comisiei de Specialitate a CNAS includerea acestui caz în programul terapeutic cu Rimonabantum (Acomplia), pe baza următoarelor argumente :

---

---

---

### III. Criterii de prioritizare pentru programul de tratament cu Acomplia

Pacienții cu vârstă de peste 18 ani, care au cumulativ toți factorii majori de risc cardiometabolic:

- Diabet zaharat tip 2;
- Control glicemic inadecvat sub tratament antidiabetic în monoterapie cu Metformin sau Sulfoniluree;
- Obezitate ( $IMC > 30 \text{ kg/m}^2$ ) cu obezitate abdominală (obiectivată prin circumferința taliei de  $> 88 \text{ cm}$  la femei, respectiv  $>102 \text{ cm}$  la bărbați);
- Dislipidemie aterogenă (HDL colesterol scăzut  $< 40\text{mg/dl}$  la bărbați și  $< 50\text{mg/dl}$  la femei; trigliceride crescute  $\geq 150 \text{ mg/dl}$ ).

Se menționează criteriile de prioritizare îndeplinite de pacient:

---

---

---

---

#### **IV. Schema terapeutică a pacientului cu risc cardiometabolic pentru inițierea tratamentului cu Rimonabantum (Acomplia)**

*Tratamentul va fi inițiat numai de medicii endocrinologi, diabetologi, cardiologi și de medicină internă.*

- Inițierea și menținerea unei diete hipocalorice ușoare (se menționează numărul de calorii):
- Activitatea fizică moderată zilnică (se menționează dacă s-a făcut educația pacientului):
- Doza inițială de Rimonabantum (Acomplia): 20 mg o dată pe zi.

Data \_\_\_\_\_ Semnătura și parafa \_\_\_\_\_