

„CONDITIILE ACORDARII APARATELOR DE VENTILATIE NONINVAZIVA”

ASIGURAT: Nume /prenume _____; CNP _____

***) Aparatele de ventilație noninvasivă se acordă pentru următoarele afecțiuni:

- boală toracică restrictivă (scolioza gravă, pectus excavatum - stern înfundat, pectus carinatum - torace în carenă, boala Bechterew, deformarea postoperatorie sau posttraumatică, boala pleurală restrictivă);
- boală neuromusculară;
- fibroza chistică;
- bronhopneumopatia obstructivă cronică.

Pentru boala toracică restrictivă și boala neuromusculară, alături de simptomele de insuficiență respiratorie și alterarea calității vieții, trebuie îndeplinit cel puțin unul dintre criteriile de mai jos:

- hipercapnie cronică diurnă cu $\text{PaCO}_2 \geq 45$ mm Hg,
- hipercapnie nocturnă cu $\text{PaCO}_2 \geq 50$ mm Hg, demonstrată prin analiza gazelor sanguine imediat după momentul trezirii;
- normocapnie diurnă cu creșterea nivelului PTCO_2 cu ≥ 10 mm Hg pe timp de noapte, comparativ cu valoarea diurnă, demonstrată prin capnometrie transcutanată sau respiratorie.

Pentru fibroza chistică, alături de simptomele de insuficiență respiratorie și alterarea calității vieții, la pacient trebuie îndeplinit cel puțin unul dintre criteriile de mai jos:

- hipercapnie cronică diurnă cu $\text{PaCO}_2 \geq 60$ mm Hg,
- hipercapnie nocturnă cu $\text{PaCO}_2 \geq 65$ mm Hg demonstrată prin analiza gazelor sanguine imediat după momentul trezirii,
- hipercapnie cronică diurnă cu $\text{PaCO}_2 \geq 60$ mm Hg și creșterea nocturnă a nivelului PTCO_2 cu ≥ 10 mm Hg pe timp de noapte, comparativ cu valoarea de la culcare, demonstrată prin capnometrie transcutanată sau respiratorie,
- hipercapnie cronică diurnă cu $\text{PaCO}_2 \geq 55 - 60$ mm Hg și cel puțin 2 exacerbări acute cu acidoză respiratorie care au necesitat spitalizare în ultimele 12 luni,
- ca urmare directă a unei exacerbări acute care necesită ventilație invazivă sau neinvazivă, dacă valoarea $\text{PaCO}_2 > 55$ mm Hg persistă chiar și după stabilizarea stării.

Pentru bronhopneumopatia obstructivă cronică, alături de semnele de insuficiență respiratorie alterarea calității vieții, trebuie îndeplinit unul dintre următoarele criterii:

- $\text{PaCO}_2 > 50$ mmHg într-o perioadă stabilă
- $\text{PaCO}_2 > 55$ mmHg la externare după o exarcebare severă care a necesitat ventilație non-invazivă sau invazivă în cursul spitalizării; pacientul va fi evaluat la 3 luni de la externare pentru menținerea indicației prin criteriul precedent.

Durata prescripției este de maximum 90/91/92 de zile în funcție de starea clinică și evoluția afecțiunii pentru persoanele care nu sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav și de maximum 12 luni pentru persoanele care sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav, cu excepția persoanelor care sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav definitiv, pentru care durata prescripției este nelimitată.

Medici curanți care fac recomandarea:

- medici de specialitate pneumologie, pneumologie pediatrică și pediatrie cu atestat în Managementul general, clinic și terapeutic al tulburărilor respiratorii - Ventilație non-invazivă, care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale;
- medici de specialitate anestezie și terapie intensivă care sunt în contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale.

Data emiterii _____ Semnătura (olografă sau electronică, după caz)și parafa medicului _____

Nota: se bifeaza casuta corespunzatoare parametrilor in baza carora se emite recomandarea medicala