

„Condițiile acordării SUPORTULUI DE PRESIUNE POZITIVA CONTINUA CPAP/BPAP”

ASIGURAT: Nume /prenume _____ ; CNP _____

Indicații:

a. pacienți cu Sindrom de apnee în somn de tip obstructiv și mixt:**Adulți:** sindr.de apnee în somn de tip obstructiv și mixt se clasifică: sever - IAH > 30; moderat - IAH 15-30;
 ușor - IAH <15 (pt. pacient înalt simptomatic, cu scor Epworth ≥ 10);**Copii:** sindrom.de apnee în somn de tip obstructiv/mixt se clasifica: ușor - IAH între 1 – 5; moderat - IAH între 5 și 10;
 sever - IAH mai mare/= 10.

Cod	Dispozitive recomandate
	Suport de pres. pozitivă continuă admin. la nivelul căilor aeriene superioare care necesită stabilire prin titrare – CPAP cu card de complianță
	Suport de pres.pozitivă continuă admin.la nivelul căilor aeriene sup.cu posib.auto-ajustării presiunii– Auto CPAP cu card de complianță
	Suport de presiune poz.continuă cu 2 nivele administrat la nivelul căilor aeriene sup.emise spontan și stabilite prin titrare– Bi-level S cu card de complianță, în cazul eșecului sau intoleranței la terap.cu CPAP/aCPAP,
	Suport de presiune poz.continuă cu 2 nivele admin.la nivelul căilor aeriene sup.cu posib.controlului frecvenței respiratorii și a controlului volum.curent administrat – Bi-level S/T cu opțiune de asistență a volumului cu card de complianță, în cazul eșecului sau intoleranței la terapia cu CPAP/aCPAP.
	Suport de presiune pozitivă continuă cu 2 nivele cu posibilitatea auto-ajustării acestora - Auto Bi-level cu card de complianță și funcție pressure relief, în cazul intoleranței la terapia cu Bi-level S sau S/T

b. Sindrom de apnee în somn de tip central: Pentru pacienții cu IAH>5/h cu prez. apneelor și hipopneelor de tip central > 50% din înregistrare/evenim. centrale >50% din IAH (minim >2,5/h) demonstrate polisomnografic/ poligrafic. /Se efectuează inițial titrare CPAP.

Cod	Dispozitive recomandate
	Suport de presiune pozitivă continuă administrat la nivelul căilor aeriene superioare care necesită stabilire prin titrare – CPAP cu card de complianță
	Suport de presiune pozitivă continuă cu 2 nivele administrat la nivelul căilor aeriene superioare cu posibilitatea controlului frecvenței respiratorii tip Bi-level S/T pentru tratamentul apneei centrale, complexe, mixte și al respirației periodice cu card de complianță
	Suport de presiune pozitivă continuă cu 2 nivele cu posibilitatea auto-ajustării acestora - Auto Bi-level cu card de complianță și funcție pressure relief, în cazul intoleranței la terapia cu Bi-level S sau S/T.

c. Respirație periodică tip Cheyne Stokes: există episoade de > 3 apnee centrale consecutive și / sau hipopnee centrale separate de un crescendo și o schimbare descrescendo a amplitudinii resp. cu o lungime a ciclului de > 40 secunde,
 există > 5 apnee centrale și/sau hipopnee centrale pe ora de somn asociate cu modelul de respirație crescendo / descrescendo înregistrate în decurs de > 2 ore de monitorizare.

Apneele centrale sunt demonstrate polisomnografic/poligrafic. Se efectuează inițial titrare CPAP.

Cod	Dispozitive recomandate
	Suport de presiune pozitivă continuă administrat la nivelul căilor aeriene superioare care necesită stabilire prin titrare – CPAP cu card de complianță
	Suport de presiune pozitivă continuă cu 2 nivele administrat la nivelul căilor aeriene superioare cu posibilitatea controlului frecvenței respiratorii tip Bi-level S/T pentru tratamentul apneei centrale, complexe, mixte și al respirației periodice cu card de complianță.
	Suport de presiune pozitivă continuă cu 2 nivele cu posibilitatea auto-ajustării acestora - Auto Bi-level cu card de complianță și funcție pressure relief, în cazul intoleranței la terapia cu Bi-level S sau S/T.

d. Sindrom de apnee în somn complex: Emergența sau persistența apneelor centrale (nr. apnee pe ora de somn ≥ 5) sau a respirației Cheyne-Stokes la pacienții cu sindrom de apnee în somn obstructiv aflați sub tratament CPAP care au eliminat excelent, bine sau mulțumitor evenimentele obstructive.

Cod	Dispozitive recomandate
	Suport de presiune pozitivă continuă cu 2 nivele administrat la nivelul căilor aeriene superioare cu posibilitatea controlului frecvenței respiratorii tip Bi-level S/T pentru tratamentul apneei centrale, complexe, mixte și al respirației periodice cu card de complianță.
	Suport de presiune pozitivă continuă cu 2 nivele cu posibilitatea auto-ajustării acestora - Auto Bi-level cu card de complianță și funcție pressure relief, în cazul intoleranței la terapia cu Bi-level S sau S/T

e. Sindrom de obezitate – hipoventilație (se asociază în 90% din cazuri cu SASO): Trebuie îndeplinit cel puțin unul dintre criteriile:

- Hipercapnie nocturnă cu PaCO₂ ≥ 55 mm Hg demonstrată prin analiza gazelor sanguine imediate după momentul trezirii,
 Creșterea nivel. PTCO₂ ≥ 10 mm Hg pe timp de noapte comparativ cu valoare de la culcare, demonstrată prin capnometrie transcutanată sau respiratorie,
 Poligrafia, polisomnografia sau pulsoximetria continuă nocturnă arată SaO₂ <90% cu durata de > 30% din înregistrare sub CPAP,
 În timpul titrării manuale polisomnografice, SpO₂ este ≤ 90% timp de 5 minute sau mai mult, cu un minim de cel puțin 85%,
 Indice de masa corporala peste 40 kg/m².

Cod	Dispozitive recomandate
	Suport de pres. pozitivă continuă administrat la nivelul căilor aeriene superioare care necesită stabilire prin titrare – CPAP cu card de complianță
	Suport de pres.poz.contin.cu 2 nivele de presiune emise spontan admin. la niv.căilor aeriene sup.și stab.prin titrare– Bi-level S cu card de complianță
	Suport de presiune pozitivă continuă cu 2 nivele administrat la nivelul căilor aeriene superioare cu posibilitatea controlului frecvenței respiratorii și a controlului volumului curent administrat – Bi-level S/T, cu opțiune de asistență a volumului cu card de complianță
	Suport de pres.poz. continuă cu 2 nivele cu posibilitatea auto-ajustării acestora - Auto Bi-level cu card de complianță și funcție pressure relief, în cazul intoleranței la terapia cu Bi-level S sau S/T

Durata prescripției este de max.90/91/92 de zile în funcție de starea clinică și evoluția afecțiunii, pentru pers. care nu sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav și de max. 12 luni pentru pers. care sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav, cu excepția pers. care sunt încadrate în grad de handicap accentuat sau grav definitiv, pentru care durata prescripției este nelimitată, cu posib.reînnoirii după citirea cardului de complianță, dacă complianța la terapie este de ≥/ = 4 ore pe noapte în ≥/ = 70% din nopți în ultimele 3 luni.**Medici curanți** care fac recomandarea: medicii de orice specialitate cu atestat în Managementul general, clinic și terapeutic al tulb.resp. din timpul somnului - Somnologie, în Managementul general, clinic și terap. al tulb. respiratorii din timpul somnului - Somnologie poligrafic, polisomnografie și titrare CPAP/BPAP, care sunt în contract cu CAS pentru furnizarea de servicii medicale.

Data emiterii _____

Semnătura olografă / electronică și parafa medicului _____

Nota: se bifează casuta corespunzătoare parametrilor în baza carora se emite recomandarea medicală