

FIŞĂ DE CONTINUARE A TRATAMENTULUI CU RIMONABANTUM (ACOMPLIA) PENTRU PACIENTUL CU RISC CARDIOMETABOLIC

I. Date de identificare

a. Numele și prenumele pacientului _____

Data nașterii (zi, luna, an) _____ CNP _____

Domiciliul _____ tel _____

b. Diagnostic: obezitate _____ / comorbidități _____

c. Părinte sau susținător legal (numele)

Calitatea _____

Domiciliul

d. Medic curant (numele și prenumele) _____

Specialitatea _____ instituția (denumirea, adresa,
telefon/fax,e-mail)

e. Medic de familie (nume și prenume) _____

Unde poate fi contactat _____

II. Criterii de evaluare a eficacității terapeutice în monitorizarea pacienților aflați în tratament cu Rimonabantum (Acomplia)

1. Reevaluările pentru monitorizarea pacienților din programul terapeutic cu Rimonabantum (Acomplia) vor fi efectuate de un **medic specialist: endocrinolog sau diabetolog, cardiolog, medicina internă,** numit **medic curant.**

A. Control clinic:

■ **La o lună** (anamneză, examen clinic general care să includă obligatoriu măsurarea circumferinței taliei și a greutății corporale; în funcție de aprecierea medicului curant, se poate recomanda la nevoie un consult psihologic/psihiatric pentru a exclude depresia majoră. Se precizează data examinării).

- Examen clinic general:

- a. Greutate corporală:
- b. Circumferința taliei:
- c. Indicele de masă corporală:

- Consult psihologic/psihiatric pentru a exclude depresia majoră, doar la indicația medicului

curant: _____

■ **La 3 luni** (anamneză, examen clinic general care să includă obligatoriu măsurarea circumferinței taliei și a greutății corporale; în funcție de aprecierea medicului curant se poate recomanda la nevoie un consult psihologic/psihiatric pentru a exclude depresia majoră. Se precizează data examinării).

- Examen clinic general:
 - a. Greutate corporală:
 - b. Circumferința taliei:
 - c. Indicele de masă corporală:
- Consult psihologic/psihiatric pentru a exclude depresia majoră, doar la indicația medicului curant: _____

■ **La 6 luni** (anamneză, examen clinic general care să includă obligatoriu măsurarea circumferinței taliei și a greutății corporale; în funcție de aprecierea medicului curant se poate recomanda la nevoie un consult psihologic/psihiatric pentru a exclude depresia majoră. Se precizează data examinării).

- Examen clinic general:
 - a. Greutate corporală:
 - b. Circumferința taliei:
 - c. Indicele de masă corporală:
- Consult psihologic/psihiatric pentru a exclude depresia majoră, doar la indicația medicului curant: _____

■ **Semestrial** (anamneză, examen clinic general care să includă obligatoriu măsurarea circumferinței taliei și a greutății corporale. Se precizează data examinării.)

- Examen clinic general:
 - a. Greutate corporală:
 - b. Circumferință taliei:
 - c. Indicele de masă corporală:
- Consult psihologic/psihiatric pentru a exclude depresia majoră, doar la indicația medicului curant: _____

B. Control biologic:

- La fiecare 6 luni (control glicemic, trigliceride, HDL-colesterol, ± proteina C reactivă). Se anexează buletinele de analize în original, semnate, parafate, stampilate de medic.

Parametri biologici	Valori la 6 luni/Dată	Valori la 12 luni/Dată	Valori la 18 luni/Dată	Valori la 24 de luni/Dată
control glicemic				
trigliceride,				
HDL-colesterol				
± proteina C				

reactivă			
----------	--	--	--

2. Criterii de eficacitate terapeutică (criterii de control terapeutic optim):

- **Doza de întreținere de Rimonabantum (Acomplia): 20 mg/zi**
- **Efectul maximal apare după 6 luni de tratament continuu. Durata maximă a tratamentului este de 2 ani.**
- **Prescripția poate fi continuată de medicii de familie în baza scisorii medicale eliberate de medicul curant (endocrinolog, diabetolog, cardiolog sau de medicină internă).**

Scăderea în greutate cu cel puțin 5% după 6 luni de tratament

: _____

Ameliorarea parametrilor biochimici (control glicemic, trigliceride, HDL-colesterol, ± proteina C reactivă) la 6 luni. Se anexează bulletele de analize în original, semnate, parafate, stampilate de medic.

3.Criterii de ineficiență terapeutică:

Revenirea la greutatea inițială sub tratament cu Rimonabantum:

Lipsa de ameliorare a parametrilor biochimici (control glicemic, trigliceride, HDL-colesterol, ± proteina C reactivă) la 6 luni:

III. Criteriile de excludere (întrerupere) din programul de tratament cu Rimonabantum

Se bifează motivul excluderii:

1. Pacienții care au contraindicații pentru tratamentul cu Rimonabantum (Acomplia):

- Boala depresivă curentă
- Tratament curent cu antidepresive
- Tratament curent cu antipsihotice atipice
- Tratament curent cu antiepileptice
- Pacientii supraponderali / obezi fără factori de risc asociați
- Vârstă sub 18 ani

2. Pacienții care nu îndeplinesc criteriile de eficiență terapeutică de la punctul II.2.

3. Apariția reacțiilor adverse

4. Apariția sarcinii

5. Complianța scăzută la tratament și monitorizare.

Data _____ Semnătura și parafa _____